DÔMES PHARMA




VADEMÉCUM

Guía de productos

Dômes Pharma

Dômes Pharma, es un grupo veterinario francés, familiar e internacional, fundado hace 78 años, dedicado a los animales de compañía.



Nuestra misión

(Re)inventar, con pasión y humanidad, soluciones para la salud y el bienestar de las mascotas, para una mayor complicidad y una vida mejor.


Nuestros valores

Nuestro legado también incluye valores históricos que dan sentido a nuestras acciones. Estos valores son los pilares de nuestra cultura corporativa, el vínculo común que nos impulsa:

- Pensar con **AUDACIA**
- Actúa con **RESPONSABILIDAD**
- Mostrar **AMABILIDAD**

Nuestras áreas terapéuticas

En el canal veterinario, a nivel mundial
Al servicio de los veterinarios y el personal de las clínicas, lideramos áreas terapéuticas especializadas desatendidas a través de una estrategia holística que brinda valor e innovación.



Índice

GAMA DE OFTALMOLOGÍA

Duomyxin® ..... p. 4
Stromease® ..... p. 4
Ocryl® ..... p. 5
OphtaPRIME® ..... p. 5
Remend® 0.4 ..... p. 6
Remend® 0.75 ..... p. 6
Ocry-gel ™ ..... p. 7
Lysine PLUS ..... p. 7

GAMA ANTI-TOX

Vitamivet K1® 50 mg Inyectable ..... p. 9
Vitamivet K1® 10 mg/ml Comprimidos ..... p. 9
Emedog® ..... p. 10
Carbodote® ..... p. 10
Carbodote® Prime ..... p. 11
Carbodote® Repeat ..... p. 11

GAMA DE EPILEPSIA

Soliphen® ..... p. 13
Ziapam® ..... p. 14
Vetbromide® ..... p. 14

GAMA DE ANSIEDAD

Tessie® ..... p. 16
Bonqat® ..... p. 16
Fluoxevet® ..... p. 17

TERAPIA CELULAR

DogStem® ..... p. 19



GAMA DE OFTALMOLOGÍA

PREVENCIÓN HIGIENE TRATAMIENTO



Duomyxin®

ANTIBIÓTICO OCULAR - Medicamento veterinario de prescripción
Administración bajo control del veterinario

4148 ESP



Frasco de 2 g de liofilizado (polvo), frasco de 5 ml de disolvente y cuentagotas.

Tratamiento de infecciones oculares superficiales causadas por bacterias sensibles a la polimixina B y la neomicina, basándose en pruebas de sensibilidad.

- Sinergia de acción entre los dos antibióticos.
- Fácil de administrar en el ojo gracias a su cuentagotas.
- Caducidad desde fabricación: 30 meses.
- Caducidad desde su reconstitución: 10 días.

- Perros y gatos. Vía oftálmica.
- Aplicar 2 gotas instiladas en el ojo(s) afectado(s) entre 3 y 4 veces al día.
- Duración del tratamiento: de 8 a 10 días.

- Neomicina (sulfato): 3.400 UI/ml.
- Polimixina B (sulfato): 10.000 UI/ml.
- Dextrano (excipiente).

Neomicina: es un antibiótico de amplio espectro de acción, cubriendo la mayoría de bacterias gram positivas y gram negativas.
Polimixina B: es un antibiótico polipéptido principalmente activo sobre bacilos gram negativos (enterobacterias, pseudomonas).

Stromease®

TRATAMIENTO APOYO ÚLCERA OCULAR Medicamento veterinario de prescripción
Administración bajo control del veterinario

4028 ESP



Frasco de 5 ml y cuentagotas.

Tratamiento de apoyo de las úlceras corneales.

- Combinación de anticolagenasas lista para usar: N-Acetilcisteína (NAC) y EDTA (excipiente).
- Fácil de almacenar, no es necesario refrigerar.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.
- Caducidad tras su apertura: 7 días.

- Perros y gatos. Vía oftálmica.
- Aplicar 2 gotas entre 3 y 4 veces al día en el ojo(s) afectado(s).
- Continuar el tratamiento hasta la curación del ojo.

- N-Acetilcisteína: 2,5%.
- EDTA (excipiente).
- Dextrano (excipiente).

N-Acetilcisteína (NAC): es un derivado del aminoácido L-cisteína y se utiliza ampliamente en medicina humana y veterinaria. Inhibe la colagenasa de forma irreversible y también la metaloproteasa-9 de la matriz (MMP-9). La regulación a la baja de las MMP previene la digestión corneal y permite la cicatrización de las heridas.
Dextrano (excipiente): facilita la difusión y prolonga el tiempo de contacto de las sustancias activas con el ojo.

Ocryl®

LIMPIADOR OCULAR - Producto de higiene





Frasco de 135 ml.

Solución ocular para la limpieza del ojo y el área periocular de costras y deshechos, así como para combatir la decoloración del pelo provocada por las lágrimas.

- Boquilla y cuentagotas preciso con punta atraumática.
- Prepara el ojo para otras gotas o pomadas.
- Caducidad desde fabricación: 24 meses.

- Perros, gatos, caballos y animales exóticos. Vía oftálmica.
- **Limpieza:** según sea necesario.
- **Tinción de lágrimas:**
  - Fase de ataque: aplicar con una toallita desmaquilladora bien embebida 1 o 2 veces al día hasta que se resuelva la coloración.
  - Fase de mantenimiento: 1 o 2 veces por semana.

- Azul de metileno, esencia de rosa, ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, agua purificada y cloruro de benzalconio.

La formulación de OCRYL ha sido especialmente diseñada para que su pH idéntico al de las lágrimas garantice una excelente tolerancia.

OphtaPRIME®

LIMPIADOR Y PROTECTOR OCULAR - Producto de higiene





Frasco de 50 ml.

Solución oftálmica 3 en 1: limpia, prepara el ojo y facilita la acción de los tratamientos antibacterianos posteriores.

- Retira impurezas y detritus.
- Facilita la acción de otros tratamientos oculares, como antibacterianos, ya que aumenta la permeabilidad de la membrana bacteriana.
- Caducidad desde fabricación: 24 meses.

- Perros, gatos, caballos y animales exóticos. Vía oftálmica.
- Aplicar el producto 5 minutos antes de aplicar otros tratamientos oculares.
- Si no hay secreción, aplicar de 1 a 2 gotas en el ojo afectado.
- Si hay secreción, aplicar una pequeña cantidad de producto en el ojo y retirar con una gasa limpia el exceso y las impurezas.
- Uso recomendado: durante 10 días.

- Trisaminometano (TRIS): 0,02%.
- Edetato de sodio (EDTA): 0,1%.
- Polisorbato 80: 0,1%.
- Sin conservantes.

Trisaminometano (TRIS): potencia la acción quelante del EDTA.
Edetato de sodio (EDTA): es un quelante de iones metálicos; su actividad modifica la estructura de las membranas celulares. Ayuda a mantener la flora ocular comensal y limita la formación de biofilm.
Polisorbato 80: es un tensioactivo y emulsionante que incrementa la permeabilidad de la membrana de algunas bacterias y contribuye a limitar la formación de biofilms.

Remend® 0.4

PROTECTOR OCULAR - Producto de higiene



Frasco de 10 ml.

Proporciona hidratación y lubricación prolongada en casos de ojo seco o irritado.

- Crea una fina barrera que calma y protege sin alterar la visión.
- Mejora la hidratación, lubricación, confort ocular y estabiliza la película lagrimal.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.
- Caducidad tras su apertura: 1 mes.

- Perros, gatos, caballos y animales exóticos. Vía oftálmica.
- Aplicar 1 o 2 gotas en el ojo u ojos afectados 2 veces al día.

- Ácido hialurónico reticulado BioHAnce™: 0,4%.
- Sin conservantes.

Ácido hialurónico (AH) reticulado: actúa como una interfaz entre el epitelio corneal y la capa acuosa de la película lagrimal.
Aumenta el tiempo de permanencia (frente al HA lineal): dura de 2 a 5 veces más que las lágrimas artificiales tradicionales, proporcionando un entorno ideal para mejorar la hidratación y lubricación de la córnea.

Remend® 0.75

REGENERADOR CORNEAL - Producto de higiene



Frasco de 3 ml.

Complemento para el tratamiento de lesiones corneales superficiales en apoyo a la regeneración celular.

- Ayuda a la regeneración celular y lubricación de la córnea.
- Efecto calmante en la superficie ocular.
- Prolonga la presencia de tratamientos tópicos en la superficie ocular.
- No se une a los antibióticos (a diferencia del suero autólogo).
- Caducidad desde fabricación: 48 meses.
- Caducidad tras su apertura: 1 mes.

- Perros, gatos, caballos y animales exóticos. Vía oftálmica.
- Aplicar 1 gota 2 veces al día sobre el ojo afectado hasta que se logre la reepitelización corneal.

- Ácido hialurónico reticulado BioHAnce™: 0,75%.
- Sin conservantes.

Ácido hialurónico (AH) reticulado de alta concentración: genera una malla reticular con propiedades físicas y químicas que aportan alta hidratación, aceleración de los procesos naturales de cicatrización y prolonga su persistencia en las superficies oculares. Favorece una regeneración corneal más rápida que el AH lineal.

Ocry-gel™

PROTECTOR OCULAR - Producto de higiene





Tubo de 10 g.

Gel a base de carbómero para la lubricación e humidificación de la córnea.

- Mantenimiento fisiológico (protección y humidificación) del ojo.
- Especialmente recomendado en pre y post anestesia/sedación para mantener la película lagrimal.
- pH y una osmolalidad idénticos a los de la película lagrimal.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.

- Perros, gatos, caballos y animales exóticos. Vía oftálmica.
- Aplicar 1 o 2 gotas sobre la superficie ocular de 1 a 2 veces al día.

- Carbopol 980 NF al 0,2%.
- Cetrimida.

Carbopol 980 NF: es un polímero hidrodispersable que puede retener más de 500 veces su peso en agua. Su poder bioadhesivo (remanencia) y su pseudoplasticidad (lubricante) lo convierten en un eficaz gel de protección ocular.

Lysine PLUS

AYUDA EN PERIODOS CRÍTICOS - Alimento complementario



Doypack con 30 comprimidos de 2 g.
Peso neto: 60 g.

Alimento complementario para apoyar la salud ocular de gatos y gatitos durante periodos críticos (parto, lactancia, destete, cambios en el ambiente, llegada al criadero, exposición, etc.).

- Formulación completa.
- Comprimidos muy palatables. En estudios de palatabilidad 89% de los gatos los ingerían espontáneamente.
- Caducidad desde fabricación: 18 meses.
- Caducidad tras su apertura: 2 meses.

- Gatos. Vía oral.
- Coloque el snack junto con un poco de comida, espere a que el gato se lo coma sin forzarlo. En caso de pérdida de apetito, puede colocarse en la boca del animal.
  - Gatitos: de medio a 1 comprimido al día.
  - Gatos adultos: de 1 a 2 comprimidos al día.
- Continuar su uso 15 días después del periodo crítico.

- L-Lisina: 500 mg.
- L-Cisteína.
- Vitamina B6.

L-Lisina: es un aminoácido esencial en los gatos. Una ingesta nutricional de 500 mg de L-lisina una o dos veces al día puede contribuir a la salud ocular de los gatos y a su bienestar general.
Cisteína: es un aminoácido que contribuye al mantenimiento de la salud de la córnea.
Vitamina B6: contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

LIFE SAVERS



THE ANTI-TOX RANGE

Vitamivet K1® 10 mg/ml Inyectable

ANTIHEMORRÁGICO - Medicamento veterinario de prescripción
Administración sólo por el veterinario

2144 ESP



Caja con 6 ampollas de 5 ml.

Tratamiento de urgencia en intoxicación con rodenticidas anticoagulantes antes de comenzar el tratamiento oral.

- Para animales sintomáticos.
- En emergencias.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.
- Caducidad tras su apertura: uso inmediato.

- Perros. Vía intravenosa.
- Inyectar MUY LENTAMENTE una dosis de 5 mg/kg (equivalente a 0,5 ml/kg) antes de iniciar la terapia oral. La inyección debe repetirse transcurridas 12-18h si no es posible administrar inmediatamente el tratamiento oral.

- Vitamina k1 o Fitomenadiona: 10 mg/ml.

Vitamina K1 o Fitomenadiona: es un cofactor necesario para la síntesis de los factores de coagulación K-dependientes (II, VII, IX y X). Los rodenticidas anticoagulantes bloquean la coagulación dependiente de la vitamina K1, provocando riesgo de hemorragia incontrolada por la ausencia de los factores II, VII, IX y X. Se debe aportar suficiente vitamina K1 para activar la vía alternativa de la enzima hidrogenasa que la convierte en su forma activa (hidroquinona).

Vitamivet K1® 50 mg Comprimidos

ANTIHEMORRÁGICO - Medicamento veterinario de prescripción
Administración bajo el control del veterinario

2732 ESP



Caja con 14 comprimidos.

Tratamiento de la intoxicación con anticoagulantes, después del tratamiento parenteral.

- Para tratamiento en perros asintomáticos con tiempo de protrombina (TP) aumentado o como continuación del tratamiento en perros sintomáticos tras la inyección de Vitamina K1 intravenosa
- Caducidad desde fabricación: 48 meses.
- Caducidad tras su apertura: 3 días (después de dividir los comprimidos).

- Perros. Vía oral.
- Administrar 5 mg/kg una vez al día, correspondiente a 1 comprimido por cada 10 kg de peso. Administrar con comida grasa.
- Tratar durante 3 semanas y evaluar estado de coagulación (TP) 48h después de la última administración.

- Vitamina K1 o Fitomenadiona: 50 mg.

Vitamina K1 o Fitomenadiona: es un cofactor necesario para la síntesis de los factores de coagulación K-dependientes (II, VII, IX y X). Los rodenticidas anticoagulantes bloquean la coagulación dependiente de la vitamina K1, provocando riesgo de hemorragia incontrolada por la ausencia de los factores II, VII, IX y X. Se debe aportar suficiente vitamina K1 para activar la vía alternativa de la enzima hidrogenasa que la convierte en su forma activa (hidroquinona).

Emedog®

EMÉTICO - Medicamento veterinario de prescripción
Administración sólo por el veterinario

3283 ESP



Caja con 5 ampollas de 1 ml.

Inducción del vómito en casos de intoxicaciones.

- Eficaz con una sola inyección.
- Concentración 1mg/ml que ayuda a evitar errores de dosificación (0,1ml/Kg PV)
- Reduce desperdicio de producto.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.
- Caducidad tras la apertura de cada ampolla: uso inmediato.


- Perros. Vía subcutánea.
- Administrar una sola inyección con dosis de 0,1 mg de apomorfina/kg peso vivo (1 vial de 1 ml corresponde a 10 kg de peso). Determinar el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

- Apomorfina: 1 mg/ml.

Apomorfina: induce el vómito mediante la estimulación de los receptores de la dopamina. Los esfuerzos expulsivos se observan entre los 2-15 min desde la inyección y pueden durar desde 2 min hasta 2,5h. La apomorfina caducada no garantiza una respuesta terapéutica adecuada, y una vez abierto el frasco, la seguridad microbiológica se puede ver comprometida. A tener en cuenta en el cumplimiento de la normativa vigente frente a la caducidad de medicamentos en el botiquín veterinario.

Carbodote®

ADSORBENTE DIGESTIVO - Alimento Complementario



Frasco de 100 ml.

Ayuda a eliminar las sustancias indeseables tras su ingestión y en caso de producción excesiva de gases intestinales (flatulencias).

- Formulación líquida de carbón vegetal lista para usar
- Puede administrarse a través de sondas de alimentación.
- Caducidad desde fabricación: 48 meses.
- Caducidad tras su apertura: 2 meses.

- Perros, gatos y animales exóticos. Vía oral.
- Administración:
  - En caso de ingestión de una sustancia indeseable: 2 - 5 ml/kg, en función de la cantidad de sustancia indeseable ingerida. Si fuera necesario, repetir cada 4 o 6h durante 24h. En caso de ingestión de una gran cantidad de sustancias indeseables, puede administrarse hasta 20 ml/kg.
  - Flatulencias: 0,5 ml/kg, por la mañana y por la noche hasta resolución.
  - Dejar pasar 3h desde la administración y la comida y/o tratamientos.

- Carbón vegetal: 24%.
- Glicerina.

Carbón vegetal: tiene un alto potencial adsorbente inespecífico (substancias venenosas, toxinas, gases, medicamentos…). Después de la administración oral, no se absorbe a través del tracto digestivo. Recubre la pared intestinal y absorbe sustancias potencialmente tóxicas, lo que limita su entrada al torrente sanguíneo.

Carbodote® Prime

ADSORBENTE DIGESTIVO - Alimento Complementario



Jeringa precargada de 78 g.

Ayuda a eliminar las sustancias indeseables tras su ingestión. Facilita la eliminación en las heces.

- Jeringa precargada lista para usar que se administra de forma rápida y fácil.
- Gel 2 en 1: contiene carbón vegetal y un laxante (sulfato de sodio).
- Caducidad desde fabricación: 24 meses.
- Caducidad tras su apertura: 1 mes.

- Perros y gatos. Vía oral.
- Administración:
  - Antes del primer uso, gire el anillo hasta que se observe la cantidad deseada entre el cilindro y el anillo. Un punto son 7,8 g de producto.
  - Quite el tapón y administre el producto directamente en la boca.
  - Dejar pasar 3h desde la administración y la comida y/o tratamientos orales.
- Carbodote Prime debe usarse en una sola administración.

- Carbón vegetal: 30%.
- Sulfato de sodio: 6,25%.
- Glicerina.

Carbón vegetal: tiene un alto potencial adsorbente inespecífico (sustancias venenosas, toxinas, medicamentos…). Después de la administración oral, no se absorbe a través del tracto digestivo. Recubre la pared intestinal y adsorbe sustancias potencialmente tóxicas, lo que limita la entrada al torrente sanguíneo. El **sulfato de sodio** facilita su eliminación a través de las heces.

Carbodote® Repeat

ADSORBENTE DIGESTIVO - Alimento Complementario



Jeringa precargada de 72 g.

Ayuda a eliminar las sustancias indeseables tras su ingestión.

- Jeringa precargada lista para usar que se administra de forma rápida y fácil.
- Gel de carbón vegetal puro.
- Caducidad desde fabricación: 24 meses.
- Caducidad tras su apertura: 1 mes.

- Perros, gatos y animales exóticos. Vía oral.
- Administración:
  - Antes del primer uso, gire el anillo hasta que se observe la cantidad deseada entre el cilindro y el anillo. Un punto son 7,2 g de producto.
  - Quite el tapón y administre el producto directamente en la boca.
  - Dejar pasar 3h desde la administración y la comida y/o tratamientos.
- La administración de la misma cantidad se puede repetir cada 4 a 6h durante 24h.

- Carbón vegetal: 30%.
- Glicerina.

Carbón vegetal: tiene un alto potencial adsorbente inespecífico (sustancias venenosas, toxinas, medicamentos…). Después de la administración oral, no se absorbe a través del tracto digestivo. Recubre la pared intestinal y adsorbe sustancias potencialmente tóxicas, lo que limita la entrada al torrente sanguíneo.


THE
EPILEP3Y
SYSTEM

Soliphen® 15mg, 60mg y 120mg

ANTIEPILÉPTICO - Medicamento veterinario de prescripción
Psicótropo. Administración bajo control del veterinario



Cajas con 60 comprimidos divisibles.

Prevención de convulsiones causadas por epilepsia generalizada.


4054 ESP 3244 ESP 4055 ESP

- 3 presentaciones para una mayor flexibilidad de administración.
- Comprimidos con saborizante y fácilmente divisibles.
- Caducidad desde fabricación: Soliphen 15 mg 30 meses. Soliphen 60 mg y Soliphen 120 mg 36 meses.
- Caducidad tras su apertura: las porciones restantes de los comprimidos divididos deben devolverse al alvéolo del blíster y, a su vez, este guardarse en la caja, para utilizar en la siguiente toma.

- Perros (peso mínimo de 3 kg). Vía oral.
- Administrar una dosis inicial de 2 - 5 mg/kg/día que debe dividirse en dos tomas diarias.
  - Soliphen 15 mg: para perros ≥ 3kg.
  - Soliphen 60 mg: para perros ≥ 6kg.
  - Soliphen 120 mg: para perros ≥ 12kg.
- Los comprimidos deben administrarse a la misma hora cada día.
- El efecto completo aparece pasadas 2 semanas.

- Fenobarbital: 15 mg, 60 mg y 120 mg.

Fenobarbital: barbitúrico que disminuye la transmisión monosináptica, reduciendo la excitabilidad neuronal, y aumenta el umbral motor del córtex para la estimulación eléctrica. Actúa sobre el sistema nervioso central, especificamente en el cerebro, para reducir la frecuencia y severidad de las convulsiones epilépticas. Además, aumenta la inhibición sináptica mediada por el neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico), lo que reduce la excitabilidad neuronal.



Ziapam®

SEDANTE, ANTICONVULSIVO Y RELAJANTE MUSCULAR - Medicamento veterinario de prescripción
Psicótropo. Administración bajo control del veterinario



Caja con 6 ampollas de 2 ml.

2983 ESP

Tratamiento a corto plazo de convulsiones y espasmos musculoesqueléticos de origen central y periférico. Como parte de un protocolo preanestésico o de sedación.

- Control rápido de las convulsiones.
- Caducidad desde fabricación: 48 meses.
- Caducidad tras su apertura: uso inmediato.

- Perros y gatos. Vía intravenosa. Inyectar lentamente.
- Manejo a corto plazo de trastornos convulsivos: 0,5 mg/kg (0,5 ml/5 kg). Se administra en forma de bolo y se puede repetir hasta 3 veces (no en menos de 10 minutos).
- Manejo a corto plazo de espasmos musculoesqueléticos: 0,5-2,0 mg/kg (0,5-2,0 ml/5 kg).
- En protocolo de sedación: 0,2-0,6 mg/kg (0,2-0,6 ml/5 kg).
- En protocolo preanestésico: 0,1-0,2 mg/kg (0,1-0,2 ml/5 kg).

- Diazepam: 5mg/ml.

Diazepam: derivado de las benzodiacepinas que reduce los niveles subcorticales del sistema nervioso central (límbico, talámico e hipotalámico) produciendo efectos ansiolíticos, sedantes, relajantes musculoesqueléticos y anticonvulsivos. Se une a los receptores del GABA A provocando la apertura de los canales de cloro. Esto causa la hiperpolarización de la neurona postsináptica y la reducción de la actividad neuronal.

Vetbromide®

ANTIEPILÉPTICO - Medicamento veterinario de prescripción
Administración bajo control del veterinario



Caja con 60 comprimidos.

4019 ESP

Control de crisis epilépticas idiopáticas, en monoterapia o en combinación con fenobarbital para controlar los casos refractarios.

- Comprimidos fácilmente divisibles en mitades o cuartos iguales.
- Caducidad desde fabricación: 48 meses.
- Caducidad tras su apertura: las porciones restantes de los comprimidos divididos deben devolverse al alvéolo del blíster.

- Perros. Vía oral.
- Administrar dos veces al día, con alimentos.
  - Monoterapia: 30 mg/kg dos veces al día. A partir de perros de 5 kg.
  - En combinación con fenobarbital: 15 mg/kg dos veces al día.
  - Si las crisis epilépticas son graves o se hace un cambio brusco de fenobarbital a bromuro de potasio, puede administrarse una dosis de carga de 60 mg/kg, dos veces al día durante 5 días.

- Bromuro de potasio: 600 mg.

Bromuro de potasio: es un haluro anticonvulsivo que sustituye al cloruro en los fluidos corporales. Compite con el transporte de este en las membranas de las células nerviosas, lo que causa la inhibición del transporte de sodio y la hiperpolarización de las membranas neuronales.

En Dômes Pharma, comprendemos, apreciamos y defendemos el profundo vínculo entre los seres humanos y los animales. Nos negamos a hacer la vista gorda ante el sufrimiento que padecen muchas de nuestras mascotas debido a la incomprensión y infradiagnóstico de una afección que sigue polarizando: **el equilibrio mental de las mascotas y los trastornos relacionados con la ansiedad.**

Es hora de cambiar esta narrativa.

Nos esforzamos por ver el mundo a través de los ojos de las mascotas

Comprendiendo sus luchas y esforzándonos por aliviar su dolor. Por eso nos enorgullece presentar una nueva gama de productos diseñados. específicamente para perros y gatos que sufren ansiedad. Este Un conjunto de herramientas único no sólo

Pretende mejorar la vida de las mascotas , sino también Ayudar a los veterinarios a identificar y tratar este trastorno que a menudo se pasa por alto.



Pero nuestra misión No se detiene allí.

Estamos en un viaje **Para aumentar la concienciación y eliminar el estigma** que rodea la salud mental de las mascotas. A traves de educación **y defensa, estamos capacitados a los tutores de mascotas** y a los vetrinarios para reconocer los signos de ansiedad y tomar medidas poactivas hacia el tratamiento y equilibrio. Juntos, podemos crear un mundo en el que cada mascota pueda vivir una vida en la que sus miedos sean abordados, llena de amor, compañia y alegría. Únanse a nosotros en esta llamada.

PET ANXIETY

LET'S BREAK THE CYCLE

Tessie®

ANSIOLÍTICO - Medicamento veterinario de prescripción
Administración bajo control del veterinario

EU/2/21/276/001



Frasco de 15 ml y jeringa oral.

Alivio a corto plazo de la ansiedad y el miedo circunstanciales provocados por el **ruido o la marcha de su tutor**.

- Solución oral de absorción digestiva.
- Puede ser administrado con seguridad hasta 9 días consecutivos.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.
- Caducidad tras su apertura: 1 año a 2-8°C o 1 mes por debajo de 25°C.

- Perros. Vía oral.
- Dosis recomendada: 0,1 ml/kg. Equivalente a 30 µg/kg de tasipimidina.
- Administrar 1h antes de dejar al perro solo o del primer ruido previsto.
- Si fuera necesario, dar cuando hayan pasado al menos 3h desde la anterior. Se puede readministrar hasta 3 veces cada 24h.
- Recomendación: 1ª dosis de prueba y si el perro presenta signos de sedación indeseados, se puede reducir a una dosis de 20 µg/kg.
- Dosis en combinación con fluoxetina o clomipramina: 20 µg/kg.

- Tasipimidina: 0,3 mg/ml.

Tasipimidina: es un agonista de los receptores alfa-2A, se une a estos en el *locus coeruleus* inhibiendo la liberación de noradrenalina, que es la que induce ansiedad y miedo en los animales expuestos a situaciones estresantes.

Bonqat®

ANSIOLÍTICO - Medicamento veterinario de prescripción

EU/2/21/273/001



Frasco de 2 ml y jeringa oral.

Alivio de la ansiedad y el miedo agudo asociados al **transporte y las visitas al veterinario.**

- Pequeño volumen de dosificación y formulación líquida con saborizante para facilidad de uso.
- Caducidad desde fabricación: 36 meses.
- Caducidad tras su apertura: 6 meses a 2-8°C o 1 mes por debajo de 25°C.

- Gatos. Vía oral.
- Administrar dosis única de 5mg/kg (0,1 ml/kg) aproximadamente 1,5h antes del primer estímulo de ansiedad.
- Puede administrarse directamente en la boca o mezclado con una pequeña cantidad de alimento.
- La ingesta de grandes cantidades de comida podría retrasar la aparición del efecto.

- Pregabalina: 50 mg/ml.

Pregabalina: es un análogo estructural del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA). Se une a la subunidad auxiliar alfa-2-delta de los canales de calcio dependientes de voltaje de las neuronas presinápticas reduciendo la entrada de calcio a la célula. La bajada del flujo de cacio reduce la liberación excesiva de neurotransmisores excitatorios (glutamato y neurotransmisores monoamina) y por lo tanto, una disminución del nivel de ansiedad.

Fluoxevet®

ANTIDEPRESIVO - Medicamento veterinario de prescripción
Administración bajo control del veterinario

4342 ESP



Frasco con 30 comprimidos divisibles.

Ayuda en el tratamiento de los trastornos relacionados con la separación en los perros.

- Comprimidos palatables fácilmente divisibles en 2 o 4 partes iguales.
- Una única presentación, sencilla de gestionar a nivel logístico y fácil de dosificar con precisión para perros de diferentes pesos.
- Caducidad desde fabricación: 48 meses.
- Caducidad tras su apertura: 120 días.

- Perros. Vía oral.
- Administrar una dosis diaria de 1 a 2 mg/kg
- Administrar con o sin alimentos.
- Se observa mejoría clínica en un plazo de una a dos semanas.
- Si no se observa ninguna mejoría en cuatro semanas, reevaluar el tratamiento del caso.

- Fluoxetina: 32 mg.

Fluoxetina: es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como su metabolito activo, la norfluoxetina. Potencia la neurotransmisión serotoninérgica y produce efectos funcionales debido al aumento de la activación de los receptores de la serotonina. No actúa como sedante y no tiene efectos directos sobre el corazón.

4 ▸ 8 kg	1/4 COMPRIMIDO
8 ▸ 16 kg	1/2 COMPRIMIDO
12 ▸ 24 kg	3/4 COMPRIMIDO
16 ▸ 32 kg	1 COMPRIMIDO
32 ▸ 64 kg	2 COMPRIMIDOS

DogStem®



Descubre el poder transformador de las células madre

DogStem®

CÉLULAS MADRE - Medicamento veterinario de prescripción
Administración solo por el veterinario

EU/2/22/285/001



Vial de 1 ml.

Reducción del dolor y la cojera asociada con la osteoartrosis en perros.

- Producto listo para usar.
- Reduce el dolor y la cojera, mejora la movilidad y la calidad de vida de los perros.
- Acción local con ausencia de efectos adversos sistémicos.
- Eficaz hasta más de 12 meses después de una sola inyección.
- Conservar en frío (2-8°C).
- Caducidad desde fabricación: 3 semanas.
- Caducidad tras su apertura: uso inmediato.
- Fabricación bajo pedido exclusivamente.

- Perros.Vía intraarticular.
- Administrar una única inyección intraarticular de 1 ml ($7,5x10^6$células madre mesenquimales de cordón umbilical equino) en la articulación afectada.

- Células madre mesenquimales de cordón umbilical equino: $7,5x10^6$/ml.

Células madre mesenquimales: tienen potencial inmunomodulador, antiinflamatorio y propiedades regenerativas de los tejidos: transforman el entorno articular inflamatorio a no inflamatorio y actúan frente al dolor, lo que es potencial para disminuir la progresión de la enfermedad. Sus propiedades pueden atribuirse a su actividad paracrina, como la secreción de prostaglandinas.

Resultados probados y duraderos[1]

Metodología:

- Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo (Marzo 2019 - Diciembre 2020 – España).
- N=80 perros (>o = 1 año y >15kg) con artrosis moderada a severa, por predisposición genética, de cadera o codo.
- Seguimiento durante las 12 semanas posteriores a la inyección (a las 4, 8 y 12 semanas) + seguimiento a largo plazo hasta 12-18 meses.

Resultados:

Mejora de la movilidad:

- **63%** Los perros mostraron una mejoría clínicame significativa en plataforma de fuerza 8 semanas después del tratamiento (aumento > o = 5% del pico de fuerza vertical vs 8% placebo; p<0.0001).
- **77%** Tuvieron una mejoría en la valoración ortopédica a la semana 8 (vs 46% placebo ; p= 0.0082).
- **65%** Los dueños consideraron que el tratamiento mejoró la calidad de vida en sus perros a las 8 semanas (vs 19% placebo ; p= 0.0002).

Durante el seguimiento a largo plazo (12-18 meses después de la inyección) se realizó una encuesta online a los dueños: Respondieron 56/70 de los dueños. Los perros del grupo placebo también recibieron la inyección de DogStem® en esta segunda fase con el fin de incrementar el número de animales tratados.

Mejoría de la calidad de vida:

- **73%** Los perros mostraron una mejoría clínicamente significativa en plataforma de fuerza 8 semanas después del tratamiento (aumento > o = 5% del pico de fuerza vertical vs 8% placebo; p<0.0001).

Efecto de larga duración:

- **59%** De los dueños reportaron que el efecto del tratamiento duró más de 6 meses (27% más de 1 año).

Seguridad:

- **0%** Efectos adversos sistémicos o graves.


1. Punzón, E., et al. (2022). Equine umbilical cord mesenchymal stem cells demonstrate safety and efficacy in the treatment of canine osteoarthritis: a randomized placebo-controlled trial. Journal of the American Veterinary Medical Association.

Contenido técnico adicional

Gama de oftalmología

"Inside the eye"

Escanea y descubre el ojo 3D y nuestros videos técnicos



Gama Anti-Tox

Pautas de actuación frente a las intoxicaciones mas comunes en perro y gato


Escanea y descubre el contenido





Gama de Epilepsia

Poster de Protocolos de tratamiento



Células madre

Taller virtual de inyecciones intraarticulares



EYE EXPERTS | THE ANTI-TOX RANGE | THE EPILEP3Y SYSTEM

PET ANXIETY
LET'S BREAK THE CYCLE | DogStem®

DÔMES PHARMA

DÔMES PHARMA IBERIA SL.
EDIFICIO NET-PHARMA. CTRA FUENCARRAL 22
28108 ALCOBENDAS, MADRID

+34 914 250 065 / contacto@domespharma.com

www.domespharma.es

MATERIAL DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A VETERINARIOS.

VA-0001 - SP